

Gebruiksaanwijzing om chloordioxide te maken

Wij hebben Chloordioxide (Citraenzuur met NaClO_2) op onszelf uitgetest en onze voorlopige bevindingen zijn: Begin met 2 druppels **Citraenzuur** aangemaakt met dezelfde hoeveelheid druppels **NaClO_2** . Kijk hoe het lichaam de eerste dag reageert. Als je niet misselijk wordt na de eerste dosis, voer dan met 1 druppel op voor de volgende dosis. Neem 1 dosis in de ochtend en 1 dosis in de avond bij voorkeur na een maaltijd. Voer telkens de dosis op met 1 druppel. Wanneer je flinke diarree en/of misselijkheid ervaart dan minder je de dosis met 2 of 3 druppels of je slaat 1 dag over om tot rust te komen. Maximaal 15 druppels per keer voor 1 tot 3 x per dag, afhankelijk van de ernst van de klachten (zie hiervoor de lijst met ziektebeelden). De benodigde sterkte van de samenstelling kan per persoon en klacht verschillend zijn.

Opmerking: diarree of braken is géén slecht teken. Het lichaam reinigt zichzelf en gooit alle gifstoffen uit het lichaam. Meestal voelt men zich beter na de diarree. De diarree verdwijnt net zo snel als het is gekomen en is van voorbijgaande aard. Wanneer het gif is afgevoert is de diarree verdwenen.

Wanneer je geen misselijkheid meer ervaart met een inname van gemiddeld 2×15 druppels per dag voor minimaal 1 week lang dan is de virus, bacterie, gist of schimmel doorgaans verdwenen uit het lichaam. Jim Humble adviseert een onderhoudsdosis van 4 tot 6 druppels per dag of minimaal 3 keer in de week deze dosis. Dit om de ideale zuurtegraad (Ph 7 neutraal) van het lichaam te handhaven (zie voor meer info 'zuur-base-evenwicht'). Lees ook het verhaal van Jim Humble en de lijst met ziektebeelden goed door.

Verdere informatie is te vinden op; www.nulpuntenergie.net/gezondheid/MMS.htm

Graag horen we uw ervaringen.

Disclaimer

Instructies voor gebruik (inname geschiedt op eigen risico!)



1 Doe 2 druppels Citroenzuur in een leeg glas...

Opmerking! Als het citroenzuur op is kan men als vervanger ook verse citroensap nemen.



2 vervolgens 2 druppels NaClO_2 (natriumchloriet) toevoegen...

Opmerking over de verhouding:

Men mag ook 5 druppels Citroenzuur op 1 druppel NaClO_2 aanmaken zoals Humble adviseert. Echter uit onze Ph test blijkt dat de effectiviteit gelijk blijft als men de hoeveelheid druppels gelijk houdt. Het mengsel wordt toch wel geactiveerd!



3 wacht tenminste 3 minuten*...

*Wacht tenminste 3 volle minuten alvorens men appelsap erbij doet, omdat de werkzame stof (chloordioxide) dan pas krachtig genoeg is om de kwaadaardige stoffen in het lichaam te doden, maar wacht ook niet veel langer dan 5 minuten anders verliest het z'n kracht. **De chloorlucht die men ruikt is normaal!**

Tip: je kunt na het inschenken van de vruchtensap ook 1 minuutje wachten totdat de chloorlucht is verdwenen en dan pas opdrinken.



4 voeg vervolgens een half glas appelsap* toe en drink op.

* Gebruik géén sinaasappelsap! Verder is elke vruchtensap goed zolang er maar géén **vitamine C** toegevoegd is, ook **ascorbinezuur of E300** moet dus vermeden worden. Kijk goed op het etiket van de fles vruchtensap! Dit antioxidant zorgt er n.l. voor dat de oplossing niet werkt. Water kun je ook gebruiken, maar vruchtensap werkt beter en het wordt sneller opgenomen door het lichaam en de afgifte van het krachtige middel chloordioxide is daardoor beter werkzaam.

It's not a miracle, it's just wonderful chemistry!